Suicidalité et troubles neurocognitifs

4^{ème} Congrès de la SF3PA

Dr Martin Comon

Gérontopsychiatre

Centre Hospitalier Le Vinatier

Pôle ψPA

Liens d'intérêt

- Aucun

Plan

- **Introduction**
- **Revue de la littérature : Troubles neurocognitifs et suicide**
 - Étiologie du TNC et suicidalité
 - Le diagnostic : une période critique
 - Profil neuropsychologique
 - TNC, suicidalité et EHPAD
 - Risque suicidaire des aidants
- **Discussion**
- **Perspectives**
- **Conclusion**

Introduction : un problème fréquent ...

- 800.000 décès par suicide / an dans le monde
- Dans les 3^{èmes} causes de décès des 15-25 ans et les 10^{èmes} causes pour les sujets > 60 ans
- Facteurs de risque similaires à tout âge :
 - Sexe masculin
 - Pathologies psychiatriques
 - Stress sociaux
- Prévention focalisée sur les sujets jeunes
 - *Naghavi 2019, Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016*
 - *World Health Organization*

Introduction : un problème fréquent ...

- *Naghavi 2019, Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016*

Introduction : ... à fortiori chez les âgés !

- Taux de suicide plus élevé chez les > 60 ans (20 à 25% du total de suicides)
- Augmentation taux de suicide avec l'âge mais plus de TS dans la tranche 60 – 74 ans
- **4 TS par suicide chez les > 60 ans VS 25 TS par suicide pour les 15 – 25 ans**
- Risque x2 à x4 pour les hommes âgés

- Koo 2017, *Suicide in older adults: differences between the young-old, middle-old, and oldest old*
- Conejero 2018, *Suicide in older adults: current perspectives*
- Naghavi 2019, *Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016*

Introduction : un problème complexe !

- Sous-estimation du nombre de décès par suicide chez les sujets âgés
 - « Suicide silencieux »
 - « Suicide passif »
 - Mort violente
- Âgisme au sein de la société et des soignants
 - Attitude fataliste vis-à-vis du suicide sujet âgé
- Mauvaise évaluation du risque suicidaire chez les sujets âgés : **45% consultent le MT dans les 4 à 8 semaines avant suicide**

- *Fazel 2020, Suicide*
- *De Leo 2022, Late-life suicide in an aging world*

Introduction : Théorie interpersonnelle du suicide

- Joiner 2010, *The interpersonal theory of suicide*
- Van Heeringen 2012, *Stress–Diathesis Model of Suicidal Behavior*
- Conejero 2018, *Suicide in older adults: current perspectives*

Introduction : Modèle Stress-Diathesis

- Joiner 2010, *The interpersonal theory of suicide*
- Van Heeringen 2012, *Stress–Diathesis Model of Suicidal Behavior*
- Conejero 2018, *Suicide in older adults: current perspectives*

Introduction : modèle du suicide de l'âge

- Isolement social, deuils, désinsertion vie communautaire et réduction activités hédoniques
- Perte d'autonomie fonctionnelle et perte de contrôle des fonctions corporelles
- Pathologies cancéreuses, arthrose/arthritis, **troubles neurologiques dont TNC**, troubles génito-urinaires (homme)
- Troubles affectifs (EDC ++), antécédents suicidaires

Suicide du sujet âgé

- *Conwell 2011, Suicide in older adults*
- *Fassberg 2012, A systematic review of social factors and suicidal behavior in older adulthood*
- *Fassberg 2016, A systematic review of physical illness, functional disability, and suicidal behaviour among older adults*

Revue de la littérature : Points généraux

- TNC : 1^{ère} cause de perte d'autonomie du sujet âgé et fréquence élevée
- Population très hétérogène : âge, étiologie et origine génétique, profil neuropsychologique, conditions socio-économiques, comorbidités somatiques et psychiatriques, déclin autonomie ...
- Exposition majeure aux facteurs de risque de suicide

- *Fassberg 2016, A systematic review of physical illness, functional disability, and suicidal behaviour among older adults*
- *Sinyor 2016, Suicide in the oldest old: an observational study and cluster analysis: A cluster analysis of suicide in the oldest old*

Étiologie du TNC et suicidalité

• Erlangsen 2020, Association Between Neurological Disorders and Death by Suicide in Denmark

Étiologie du TNC et suicidalité

- Comportement suicidaire élevé dans les TNC, sauf MA
- Risque plus élevé chez les hommes et les sujets jeunes
- Association fréquente à la dépression et au mésusage d'alcool
- TS médicamenteuses ++

- *Alipour-Haris 2022, Suicidal Ideation and Suicide-Attempt-Related Hospitalizations among People with Alzheimer's Disease (AD) and AD-Related Dementias in the United States during 2016–2018*

Étiologie du TNC et suicidalité

- Pathologies psychiatriques = FdR suicidaire dans les TNC
- Comorbidités psychiatriques
 - 45% des DFT
 - 40% des DV
 - 35% des MCL
 - 20% des MA
- **EDC ++ (surtout MCL/DV)**
- **Idées délirantes (jalousie, persécution)**

• *Lai 2018, High Occurrence of Psychiatric Disorders and Suicidal Behavior Across Dementia Subtypes*

Étiologie du TNC et suicidalité

- Plusieurs études retrouvent un risque suicidaire accru dans la DFT
- Zucca 2019 : 35 DFT vs 25 contrôles
 - 40% idées suicidaires dans la DFT vs 8% contrôle sain âgé
 - 4 TS vs 0
 - Association significative au parkinsonisme, sujet jeune, durée évolution
- Rôle de la sérotonine dans les régions préfrontales corticales
- Rôle de la dopamine dans les ganglions de la base (noyau caudé, putamen) et noyau accumbens

• *Zucca 2019, High Risk of Suicide in Behavioral Variant Frontotemporal Dementia*

Le diagnostic : une période critique

- Décès par suicide plus fréquent dans les TNC vs contrôle : RR 1,53
- 50% des suicides dans les 90 jours suivant le diagnostic
- Association à la douleur chronique, mésusage alcool, comorbidités psychiatriques
- DFT +++, VD & MCL +

Figure 1: Cumulative Incidence of Suicide Mortality During First Year Following Dementia Diagnosis Considering Competing Risk by Sex and Age Group

• Schmutte 2022, Suicide risk in first year following dementia diagnosis in older adults

Le diagnostic : une période critique

- **Pas de surrisque suicidaire dans les TNC**
- OR 2,82 pour les sujets < 65 ans avec TNC
- OR 2,47 dans les 3 mois suivants le diagnostic de TNC
- OR 1,52 pour les patients avec comorbidités psychiatriques et TNC
- OR 6,69 pour les sujets < 65 ans et diagnostic récent

• *Alothman 2022, Risk of suicide after dementia diagnosis*

Figure 2. Risk of Suicide Following Dementia Diagnosis, Stratified by Age at Diagnosis

Le diagnostic : une période critique

- Risque suicidaire majeur la 1^{ère} année
- HR 2,57 décès suicide sujets avec TNC vs sujets sains
 - HR 2,5 MA
 - HR 4,32 autres TNC
- Risque plus élevé si comorbidités psychiatriques, **surtout si diagnostic ancien et si sujet jeune**
- **Pas de surrisque en l'absence de comorbidités somatiques ou psychiatriques !**

Profil neuropsychologique et suicidalité

- Défaut d'insight
 - Faible conscience du TNC et de ses conséquences interpersonnelles :
diminution du risque suicidaire
- Atteinte des fonctions exécutives
 - Moindre capacité à planifier le suicide ?
 - Moindre flexibilité mentale et moindre capacité à inhiber les idées suicidaires ?
 - Impulsivité ?
- Trouble de la mémoire épisodique et auto-noétique
 - Moindre utilisation des souvenirs spécifiques pour inhiber idées suicidaires ?
 - Moindre capacité à se projeter dans un futur positif

- *Cipriani 2013, Dementia and suicidal behavior*
- *Hemachandra 2014, Impaired executive function in contemplated and attempted suicide in late life*
- *Richard-Devantoy 2015, Suicidal behaviour and memory: A systematic review and meta-analysis*
- *Serafini 2016, Suicide risk in Alzheimer's Disease: A systematic review*

TNC, suicidalité et EHPAD

- 40% des résident en EHPAD ont un TNC (aux USA)
 - 2/3 des sujets TNC âgés décèdent en EHPAD (aux USA)
 - Peu d'études sur cette population spécifique

 - Diminution du risque suicidaire des patients TNC en EHPAD
 - Moindre accès à des moyens létaux
 - Encadrement paramédical et médical
 - Stade modéré à évolué du TNC

 - Mais perte d'autonomie majeure, comorbidités somatiques et psychiatriques très fréquentes
 - Isolement de la famille : sujet marié
- *Joshaghani 2022, How Residing in a Long-Term Care Facility Affects Suicidal Risk in Patients With Dementia: A Systematic Review*

Et le risque suicidaire des aidants ?

- 80% des patients avec TNC ont un aidant-principal familial
- Charge mentale majeure, risque augmenté d'EDC/anxiété, négligence de la santé physique et mentale, retrait de la vie sociale
- **1/3 des aidants ont des idées suicidaires, surtout les aidants < 65 ans**
 - Trop peu d'études pour définir l'épidémiologie du suicide de l'aidant
- Diminution des idées suicidaires corrélée au sentiment d'efficacité personnelle et d'utilité
 - **Rôle de la psychoéducation aidant !**

- *Vitaliano 2003, Is caregiving hazardous to one's physical health? A meta-analysis*
- *Solimando 2022, Suicide risk in caregivers of people with dementia: a systematic review and meta-analysis*

Discussion : un débat ouvert !

- Difficultés à mener des études sur une population hétérogène et complexe (diagnostic, suivi, consentement, lien avec comorbidités, contrôle des événements suicidaires, culture)
 - Résultats parfois contradictoires !
- Risque élevé d'idéation suicidaire/TS et risque légèrement plus élevé de décès par suicide *vs population générale*
 - À fortiori DFT et VD !

Discussion : un débat ouvert !

- Importance des comorbidités psychiatriques (EDC) et facteurs psychosociaux
 - Comorbidités psychiatriques ou prodrome (MBA) / SPCD ?
- Plus l'âge au diagnostic est bas, plus le risque suicidaire est élevé
- Risque plus élevé période post-diagnostic et stade débutant TNC
 - Théorie interpersonnelle du suicide
 - Fonctions cognitives partiellement préservées
 - Insight relativement intact
- Définition de la période post-diagnostic ne fait pas consensus !

Perspectives cliniques

- Systématiser le dépistage des idées suicidaires pour les patients (*et les aidants*) au sein des consultations mémoires
- Soutien psychologique et/ou psychiatrique à proposer systématiquement aux populations à risque (patient jeune, pathologies génétiques, pathologies psychiatriques comorbides) en période critique (diagnostic, institutionnalisation)
 - **Stratification du risque et profil de patients**
- **Favoriser la connexion entre consultation mémoire et psychiatrie : former les neurologues et gériatres à l'évaluation suicidaire**
- Psychoéducation des aidants
- Renforcer la prévention primaire du risque suicidaire de l'âgé (à fortiori avec troubles cognitifs)

Conclusion

- FdR majeurs TNC et suicide : âge jeune, pathologies génétiques, pathologies psychiatriques comorbides, statut d'aidant
 - Temporalité : diagnostic et entrée en institution
 - Identifier le risque suicidaire du patient et de l'aidant lors de la prise en charge en soins primaires/secondaires
 - ✓ **Questionner systématiquement**
 - ✓ **Adapter la prise en charge au profil du patient**
-
- Modification de la perception sociale du suicide du sujet âgé et évolution de la prise en charge des TNC
 - Rôle des nouvelles thérapeutiques à venir
 - Euthanasie et suicide assisté : de nouvelles perspectives !